

國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院
National Taiwan University Hospital Hsin-Chu Branch
全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一、使用品項：EpigluTissue Adhesive 0.3g / 愛必敷組織黏膠 0.3g 20471305

二、自費金額：NT 1171.3 元(以電腦設定為主)

三、產品特性、應注意事項、副作用、與健保給付品項之療效比較：

◎產品特性：

1. 適於局部塗抹，使手術切開之傷口的鄰近皮膚邊緣容易密合(包括微創手術的穿刺，以及簡單且經徹底清潔之撕裂性外傷)，亦可與縫線搭配使用。
2. Ethyl-2-cyanoacrylate 單體時為液態狀，當與組織液或水分接觸後很快地會變為聚合物形態，所以少量的本品即可使治療傷口緊黏合在一起。

◎應注意事項：

1. 應避免沾黏眼睛，僅使用於外部傷口。
2. 應用於新鮮傷口(不超過 6 小時)，等傷口完全止血，並將傷口清潔，黏合前，勿使用藥膏或乳劑等。
3. 不能用於感染、發炎的組織及嚴重污染或大量滲液的傷口。
4. 使用前，拉合傷口，確保傷口平整，皮膚沒有皺摺。
5. 本品須存放於避光之速凍冷藏處存放。開啟後，須直立放置。

◎副作用：

1. 若本品使用不當或塗太厚，可能因聚合作用而造成組織灼傷。
 2. 本品塗抹太廣或太濃稠會阻礙結締組織的癒合
 3. 本品在依循使用說明書使用下，有良好的局部耐受性。

◎健保給付品項之療效比較：無健保可替代醫材。

四、使用原因(含不符健保給付規定之原因)：

易乾、快乾，可安定傷口並防止感染，無針線管道和緊繃的疼痛，所以對傷口有減輕疼痛的效果，減少紅斑，縮短恢復期；病患能立即恢復每日的個人衛生(如淋浴)，並且可照往常工作或者玩樂，方便、經濟、安全。