

國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院
National Taiwan University Hospital Hsin-Chu Branch
全民健康保險病人使用自費醫材說明書

一. 使用品項：” Daig” Angio-Seal Hemostatic Puncture Closure Device “戴格” 血管

穿刺後止血器 衛署醫器輸字第 009864 號 D2ZASC0S、D2ZASC1S

二. 自費金額：10790 元

三. 產品特性、應注意事項、副作用、與健保給付品項之療效比較：

本裝置把動脈脈切口夾在其主要組件(固定錨及膠原紗布)之間，並把切口封住。通過固定錨、動脈脈切口及膠原夾層的物理作用，再輔以膠原的凝血促進特性，達到止血效果。

應注意事項：

血管閉合器使用後：

1. 假如使用適當的大小，通常可以立即止血，若配合彈性繃帶效果會更好。
2. 針對大量服用抗凝血藥物或凝血不易的病人，建議平躺時間須延長(約 3 到 4 小時)，必要時可配合加壓沙袋。

手術後 2 到三小時內：

1. 病人可側翻，但傷口部位的腳請放鬆伸直，不可彎曲。
2. 當打噴嚏，咳嗽或上廁所或用力時，請以適當的力量按住或扶住傷口部位。
3. 傷口不能碰水。
4. 原則上使用完止血器，20 分鐘後可以下床從事輕微的活動，但是因個人情況不同仍須經由醫師的評估與專業判斷。

國立臺灣大學醫學院附設醫院
National Taiwan University Hospital
全民健康保險病人使用自費醫材說明書

出院後至一星期內：

1. 傷口的照護，可用清水或中性肥皂清洗傷口部位，每日更換紗布並保持傷口處乾燥，不須針對傷口進行加壓，按摩或冷熱敷，直到表皮傷口復原。
2. 避免泡澡，可沖澡，直到表皮傷口復原。
3. 避免開車或從事劇烈運動及提重物（不超過五公斤）
4. 當打噴嚏，咳嗽或上廁所或用力時，請以適當的力量按住或扶住傷口部位。
5. 若 90 天內需再次進行介入性手術，會再次進行血管的穿刺時，請事先告知醫師曾使用過本止血器。

四. 與健保給付品項之療效比較：無健保給付之品項。

使用原因(含不符健保給付規定之原因)：

使病人在血管手術導引管取出後，可省略 6-8 小時平躺時間可提早下床活動。並在凝血功能異常的情況下，可有減低局部血腫等併發症之效果。

